



52 CISTOSKOPIJA

Marko Drešček

1. Kaj je cistoskopija?

Cistoskopija oz. cistouretroskopija je preiskava, ki urologu, zdravniku specialistu za sečila, omogoča vpogled v votli del spodnjih sečil, to je v sečnico in notranjost sečnega mehurja. Ob tem lahko pregleda tudi vrat mehurja. To je del sečnice, ki gre skozi prostato, pregled pa je zelo natančen, saj so vidne vse očesu dostopne podrobnosti.

2. Kakšen je namen preiskave?

Največkrat je preiskava indicirana pri diagnosticiranju težav pri mokrenju ali razjasnitvi krvavitev iz sečil.

3. Kdo opravlja preiskavo?

Cistoskopijo mehurja opravljajo klinični specialisti urologije.

4. Kdo vas na preiskavo napoti?

Na preiskavo vas bo napotil izbrani zdravnik družinske medicine ali zdravnik specialist urologije.

5. Kako se pripravite na preiskavo?

Pred preiskavo mora preiskovanec imeti prazen mehur, zdravnika pa mora opozoriti, če jemlje kakšna zdravila proti strjevanju krvi. V primeru, da tega ne ve, naj se nekaj dni pred preiskavo posvetuje s svojim zdravnikom družinske medicine.

6. Kako preiskava poteka?

Preiskava je opravljena ambulantno. Zdravnik pod kontrolo očesa uvede poseben aparat preko sečnice v sečni mehur. Aparat se imenuje cistoskop in je naprava, sestavljena iz optične enote in daljše cevke, ki ima na koncu lučko, lahko pa tudi kamero za ogled slike na monitorju. Urolog lahko že med vstavljanjem cistoscopa ocenjuje sečnico, posebej če ima težave pri uvajanju cistoscopa v mehur. Nato skozi cistoskop v sečni mehur spusti posebno tekočino. S tem se mehur enakomerno razpre, zdravnik pa lahko pod kontrolo očesa pregleda notranjost mehurja.



7. Koliko časa traja preiskava?

Preiskava navadno traja *od 10 do 15 minut*.

8. Kakšne neprijetnosti lahko pričakujete?

Ob razpiranju mehurja preiskovanec zazna *občutek, enak tiščanju na vodo*. Če med preiskavo preiskovanec občuti, da ima zelo poln mehur, mora zdravnika na to opozoriti. Zdravnik potem mehur skozi uveden cistoskop občasno izprazni. Po odstranitvi cistoskopa je lahko *do 2 dni prisoten pekoč ali dražeč občutek v sečnici*, v redkejših primerih lahko bolnik tudi kratkotrajno krvavi iz sečil.

9. Kakšne so nevarnosti preiskave?

Če se po preiskavi pojavi krvavitev, vročina z motnjami mokrenja, pogosta ali pekoča mokrenja ali če se prej omenjena krvavitev iz sečil stopnjuje, mora preiskovanec nemudoma poiskati pomoč pri zdravniku družinske medicine ali urologu.

10. Kdaj bodo znani izvidi preiskave?

Izvid preiskave lahko prejme bolnik *takoj* oziroma skupaj z ostalimi izvidi urološkega pregleda in mnenjem urologa.

11. Čemu bodo služili izvidi?

Zdravnik med preiskavo opazuje morebitne patološke spremembe v poteku spodnjih sečil do mehurja. S preiskavo se potrdijo ali ovržejo bolezenska stanja v mehurju ali sečnici.