



74 HITRI STREPTOKOKNI TEST

Suzana Kert

1. Kaj je hitri streptokokni test?

S hitrim testom lahko zdravnik ugotovi, *ali imate vnetje žrela zaradi okužbe s posebno bakterijo – streptokok*, ne more pa vam zanesljivo povedati, kadar imate težave zaradi česa drugega.

2. Kako preiskava poteka?

Za preiskavo se uporabi bris na dolgi paličici z bombažno glavico. S tem delom se odvzame bris iz zadnje strani žrela. Kužnina se nanese na posebno testno ploščico, iz katere se odčita izvid v nekaj minutah.

3. Kako se na preiskavo pripravimo?

Posebna predpriprava ni potrebna.

4. Ali lahko vsi zbolijo doma, če ima en otrok streptokokno vnetje žrela?

Od enega bolnega družinskega člana se lahko okužijo tudi drugi. *Bolnik je kužen približno še 24 ur po zaužitju prvega odmerka antibiotika*. Zdravnik se lahko odloči, da bo testiral vse družinske člane sočasno, ni pa to splošno pravilo. Protitelesa, ki jih je posameznik razvil ob pretekli okužbi, ga sicer ščitijo proti določeni vrsti streptokoka, ker pa obstaja veliko število serotipov streptokokov, je malo verjetno, da je nekdo imun na vse serotipe. V praksi to pomeni, da lahko dobi človek streptokokno vnetje žrela vedno znova in znova.

5. Kako dolgo se naj v primeru pozitivnega testa okuženi izogiba stikom z drugimi osebami?

Priporočamo, da zaključite najprej vsaj 24-urno jemanje antibiotika, preden imate tesnejše stike z drugimi osebami.