




ZDRAVLJENJE ANAFILAKSIJE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

Anafilaksija je resna, življenje ogrožajoča generalizirana ali sistemska preobčutljivostna reakcija (1). ADRENALIN, dan v mišico stegna, je zdravilo izbora pri zdravljenju anafilaksije. Adrenalin je potrebno aplicirati otroku ali mladostniku z anafilaksijo s simptomi in znaki prizadetosti dihal ali srčno-žilnega sistema kot so: HRIPAVOST, LAJAJOČ KAŠELJ, TEŽKO POŽIRANJE, OBČUTEK TEŽKEGA DIHANJA, PISKANJE, CIANOZA, PRENEHANJE DIHANJA, NIZEK KRVNI PRITISK, IZGUBA ZAVESTI, MOTNJE SRČNEGA RITMA ALI SRČNI ZASTOJ (2, 3).



Zdravilo izbora

Dodatna zdravila

Otroka ali mladostnika z anafilaksijo je potrebno sprejeti v bolnišnico! Priporočamo tudi shranitev seruma za dodatne preiskave (npr. za določitev triptaze).

Literatura:

1. Johansson SGO, Bieber T, Dahl R, Friedmann PS, Lanier B, Lockey R, et al. A revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of World Allergy Organization. J Allergy Clin Immunol 2004; 113: 832–6.
2. Muraro A, Roberts G, Clark A, Eigenmann PA, Halken S, Lack G, et al. EAACI Task Force on Anaphylaxis in Children. The management of anaphylaxis in childhood: position paper of the European academy of allergology and clinical immunology. Allergy 2007; 62: 857-71.
3. Vesel T, Koren Jeverica A, Emeršič N, Accetto M, Bizjak R, Obermayer-Temlin A, et al, Smernice za obravnavo otroka in mladostnika z anafilaksijo. Zdrav Vestnik 2014; 83: 425- 35.

Poster so pripravili: Alergološka in imunološka sekcija SZD, Sekcija za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo, Delovna skupina pediatrov alergologov, Služba za alergologijo, revmatologijo, klinično imunologijo, Univerzitetna pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center, julij 2014. Tisk posterja je omogočilo Društvo za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi.